

Числ - 16904466744  
Оценочный балл - 69



Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Рязанский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России)

ШИФР 11-99

### ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. В конце XX в. был открыт новый класс мембранных белков, которые получили название аквапорины. Аквапорины – семейство мелких (~30 кДа) интегральных протеинов, облегчающих транспорт воды через плазматическую мембрану клетки в ответ на осмотические градиенты. Они играют важную роль в жизнедеятельности клетки и целого организма. С чем это связано? Выберите верные утверждения:

- 1) Аквапорины пропускают через мембрану воду с более низкой скоростью, чем при осмосе;
- 2) Аквапорины проницаемы для заряженных частиц;
- 3) Аквапорины содержатся в мембранах только животных клеток;
- 4) С нарушениями в работе аквапоринов связан несахарный диабет;
- 5) Эти белки отвечают за всасывание воды в собирательных трубочках почечных канальцев;
- 6) При дефиците аквапорина нарушена секреция слюны и слизи дыхательных путей.

Ответ: 

4	5	6
---	---	---

**2. Главным событием внутренней стадии оплодотворения у млекопитающих является судьба генетического материала обеих гамет, который претерпевает существенные изменения. Они заключаются в следующем:**

- 1) В течение первых 24 часов после проникновения сперматозоида овоцит второго порядка заканчивает второе мейотическое деление и образуется второе редукционное тельце;
- 2) Овоцит второго порядка становится диплоидным;
- 3) Происходит репликация ДНК в ядрах пронуклеусов;
- 4) В момент слияния в каждом пронуклеусе содержится удвоенное количество ДНК;
- 5) После слияния ядер, быстро образуется метафазная пластинка с набором 2 n 2c и происходит первое дробление зиготы;
- 6) В течение первых 24 часов после проникновения сперматозоида овоцит первого порядка заканчивает второе мейотическое деление и образуется первое редукционное тельце.

Ответ: 1 | 3 | 4

**3. На 7-8 неделе у плода человека имеются:**

- 1) 5 мозговых пузьрей головного мозга;
- 2) 3 мозговых пузьря головного мозга;
- 3) Трехкамерное сердце;
- 4) Четырехкамерное сердце;
- 5) Предпочка;
- 6) Сформированные ушные раковины.

Ответ: 2 | 4 | 5

**4. Какие гормоны впервые появляются у позвоночных, вышедших на сушу?**

- 1) Прогестерон;
- 2) Альдостерон;
- 3) Вазопрессин;
- 4) Антидиуретический гормон;
- 5) Соматотропин;
- 6) Адреналин.

Ответ: 2 | 3 | 4

5. Жизненные формы каких паразитов человека могут быть обнаружены при микроскопии капли пресной воды? Выберите все верные ответы:

- 1) Маллярийного плазмодия;
- 2) Трихинеллы;
- 3) Вольфартовой мухи;
- 4) Печеночного сосальщика;
- 5) Широкого лентеца;
- 6) Ришты.

Ответ: 2 | 4 | 5

6. В последнее время в исследованиях по изучению механизмов продолжительности жизни на моделях животных внимание ученых всего мира привлекает *Heterocephalus glaber* — голый землекоп, уникальный вид грызунов, происходящий из области Африканского Рога. Проанализируйте кривую смертности этого животного: по оси ординат отложена вероятность умереть в течение года (в процентах), а по оси абсцисс — возраст голого землекопа (в годах). Выберите верные утверждения, характеризующие этого грызуна:




Рисунок 1. Иллюстративная кривая смертности голого землекопа

- 1) С возрастом вероятность умереть в течение года повышается;
- 2) Кривая его смертности соответствует «классической» экспоненте;
- 3) Возраст жизни голого землекопа такой же, как и у мышей, с возрастом проявляет признаки выраженного старения;
- 4) Плато отражает стабилизацию уровня смертности;
- 5) Голый землекоп живет на порядок дольше мышей, проявляя признаки пренебрежимого старения;
- 6) Кривая его смертности далека от «классической» экспоненты.

Ответ: 4 | 5 | 6

7. Известно несколько способов бесполого размножения. Особенным является полизембриония. Впервые полизембрионию у животных обнаружил И. И. Мечников в 1886. Выберите верные характеристики этого способа размножения:

- 1) Образование нескольких зародышей из нескольких зигот;
- 2) Образование нескольких зародышей из одной зиготы;
- 3) Образуются потомки разных полов;
- 4) У потомков наблюдается генетический полиморфизм;
- 5) Характерен для броненосцев;
- 6) Встречается у человека.

Ответ: 2 | 5 | 6

8. Врач – лаборант проанализировал митотическое деление клеток различных типов тканей для подсчета митотического индекса каждой. Митотический индекс (МИ) – количество делящихся клеток на 1000 клеток этой ткани. Было выяснено, что на анализируемом микропрепарate № 1 – МИ = 100/1000, на микропрепарате № 2 – МИ = 10/1000, на микропрепарате № 3 – МИ= 1/ 1000. Выберите из приведенного списка название типа ткани (I-III), которому соответствуют МИ и примеры тканей (А - З), относящихся к каждому типу (один тип ткани может иметь несколько примеров). Ответ запишите в таблицу:

Тип ткани:		Примеры тканей:
I.	Стабильные	А) Эпителий тонкой кишки
II.	Обновляющиеся	Б) Эмбриональные В) Кардиомиоциты
III.	Растущие	Г) Красный костный мозг Д) Опухолевые Е) Нервная Ж) Эпидермис З) Эмаль зубов

Ответ:

МИ	Тип ткани (цифры)	Пример (буквы)
100/1000	III	Г, Ж
10/1000	II	А, В, Е
1/1000	I	Б, З

9. Установите соответствие цвета крови (1-5) и белка (А-Д), определяющего этот цвет, с представителями из разных групп живых организмов (I - V). Ответ запишите в таблицу:

Цвет крови:	Название белка:	Представители:
1) Красный	А) Гемоглобин	I. Приапулиды, плененогие
2) Желтый	Б) Хлорокруорин	II. Осьминоги
3) Зеленый	В) Гемованадий	III. Млекопитающие
4) Голубой	Г) Гемоцианин	IV. Кольчатые черви
5) Фиолетовый	Д) Гемэритрин	V. Асцидии

Ответ:

Цвет крови	1	2	3	4	5
Название белка	A	Б	Д	Г	В
Представители	III, IV, V	IV	IV	II	I

10. Трансплантация – это перспективное направление в медицине, позволяющее осуществлять пересадку органов и тканей. Установите соответствие между видом трансплантации и ее характеристикой. Ответ запишите в таблицу.

Вид трансплантации:

1. Аутогенная
2. Изогенная
3. Сингенная
4. Аллогенная
5. Ксеногенная
6. Имплантация

Характеристика:

- А. Между однояйцевыми близнецами
- Б. Донор и реципиент одно и то же лицо
- В. От чужого человека
- Г. От животного человека
- Д. Между родственниками 1-й степени
- Е. Использование синтетических материалов

Ответ:

Вид трансплантации	1	2	3	4	5	6
Характеристика	Г	Б	А	Д	В	Е

11. В эволюции животного мира важная роль принадлежит формированию полости тела. Установите соответствие между представителем (1-7) и полостью тела (А - Г). Ответ запишите в таблицу:

Представители:	Полости тела:
1. Печеночный сосальщик	А – Первичная
2. Малый комар	Б – Вторичная
3. Ланцетник	В – Миксоцель
4. Человеческая аскарида	Г – Полость тела отсутствует
5. Эхинококк	
6. Таежный клещ	
7. Обыкновенная гадюка	

Ответ:

Представитель	1	2	3	4	5	6	7
Полость тела	A	б	б	A	Г	B	б

12. Очень точно приступ этого паразитарного заболевания описал Жюль Верн в романе «Таинственный остров». «Герберт почти всё время лежал в полузытьи. У него начался бред. Лихорадка ещё не очень мучала его, но вскоре её приступы стали повторяться регулярно. Приступы лихорадки сопровождались увеличением печени. Он бредил, метался, кричал. Ему чудилось, что он борется с пиратами. Потом силы покидали его, и он лежал в глубоком оцепенении, без чувств, без движения». За открытие в конце XX века лекарства от этого заболевания на основе полыни – артемизии профессору Китайской академии традиционной медицины You You Ti была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине в 2015 г. Ответьте на вопросы:

1. О каком заболевании идет речь?
2. Назовите возбудителя этого заболевания?
3. Как человек заражается этим заболеванием?
4. Укажите главные симптомы болезни.
5. Как диагностируют это заболевание сегодня?
6. Какие существуют меры профилактики данного заболевания?

Ответ:

1. Малый
2. малый комар
3. Человек, будучи уменьшённым, заражается через укус малого комара
4. Увеличение печени вследствие развития в гепатоцитах новых поколений малярий. Выход их в кровяное русло (легионная малярия) сопровождается лихорадкой; при повторении эритроцитов малярии повторяются каждые 24-48 часов (эритроцитарная малярия). Возникает анемия из-за избытка эритроцитов.

5. диагноз крови (бактериальный анализ крови) позволяет определить присутствие паразитов в кровяном русле

6. • использование инсектицидов для борьбы с комарами-переносчиками • вытеснение водоплавающих (бройль с мигрирующими клювами) из гнезд гусей; разведение ряда гаптонимов, которых питается мигрирующей птицей

13. В рамках «Глобальной стратегии ВОЗ в области питания, физической активности и здоровья» был разработан план действий по контролю и профилактике неинфекционных заболеваний. Многие исследователи установили прямую зависимость между содержанием поваренной соли в пище и показателем артериального давления. Известно, что физиологически артериальное давление зависит от сердечного выброса (частота сердечных сокращений  $\times$  ударный объем) и общего периферического сосудистого сопротивления. Вовлечеными в процесс изменения артериального давления также оказываются эндокринные механизмы. Объясните, как и с какими механизмами связано патологическое изменение артериального давления, обусловленное поваренной солью. Ответьте на вопросы:

1. Какие гормоны отвечают за водно-солевой обмен?
2. В каких железах синтезируются эти гормоны?
3. Какие процессы возникают под влиянием этих гормонов в случае избыточного потребления человеком хлорида натрия?
4. Как изменится величина сердечного выброса в случае избыточного потребления человеком хлорида натрия?
5. Что произойдет с периферическим сопротивлением сосудов под влиянием увеличения содержания хлорида натрия?
6. Как изменится артериальное давление при избыточном потреблении соли?

Ответы:

1. За водно-солевой обмен отвечают гормоны антидиуретин, вазопрессин (антidiureticкий гормон).
2. Активестерин синтезируется в надпочечниках, вазопрессин синтезируется в гипоталамусе.
3. Вазопрессин обеспечивает обратное всасывание воды в легочных капиллярах (капиллярный реабсорбция). При избыточном потреблении Na<sup>+</sup> концентрация соли в организме гиповолемия станет высокой и по закону Омсона вода будет сохраняться в организме, т.е. в слизистой оболочке кишечника. Всасывание воды будет усилено, т.к. усиливается секреция в клетках вазопрессина. Вследствие увеличения концентрации ионов Na<sup>+</sup> будет активизироваться симпатический отдел ВНС.

4. Величина сердечного выброса также увеличивается из-за активизации симпатической отвертки
5. Периферическое сопротивление сосудов увеличивается
6. Артериальное давление возрастает.

14. Решите задачу. Вес взрослой куницы составляет 1,8 кг. Основным рационом являются полевки, вес которых составляет 30 г. Сколько полевок потребуется съесть детенышу куницы весом 600 г (питался исключительно полевками) для достижения веса взрослой особи?

Решение:

$$\begin{aligned} & 1800 \text{ г} - \text{взрослая куница; детёныш} - 600 \text{ г} \\ & \text{Необходимо набрать вес: } 1800 - 600 = 1200 \text{ г} \\ & \text{Этот вес - лишь } 10\% \text{ от всей пищи, которую усвоили организмы следующим образом необходи-} \\ & \text{мо съесть! } 1200 : 10 = 12000 \text{ г} \quad \text{вес полёвки: } 30 \text{ г} \\ & \text{Кол-во полёвок: } \frac{12000}{30} = 400 \text{ полёвок} \end{aligned}$$

Ответ: 400

15. Решите задачу. У пчел миролюбие доминирует над агрессивностью. Признак высоких санитарных способностей (очистки ячеек и гнезд от больных и погибших личинок и куколок) по отношению к признаку отсутствия этого качества является рецессивным. Способность активно собирать пыльцу с люцерны является доминантным признаком и наследуется промежуточно. Скрещивали агрессивную чистоплотную матку, гетерозиготную по гену активности сбора пыльцы с миролюбивым трутнем, имеющим гены отсутствия чистоплотности и низкой активности сбора пыльцы (трутни имеют гаплоидный набор хромосом в соматических клетках). Полученных от этого скрещивания особей, одна из которых была агрессивна и имела в генотипе ген активного сбора пыльцы, а другая обладала средней активностью сбора пыльцы, скрестили между собой. Запишите генетическую схему решения задачи и определите вероятность (в %) появления во втором поколении особей миролюбивых, чистоплотных и способных активно собирать пыльцу в период цветения люцерны.

Решение:

A - именит.

a - адресат

B - отчужд.

b - сущитар.

Ce - содержит позиц с именит

I) Первое склон:

P:  $\begin{matrix} a \\ b \\ c \end{matrix}$   $\xrightarrow{\text{имп. енк. иск.}}$  Ce  $\xrightarrow{\text{имп. енк. иск.}}$  A B C

G:  $\begin{matrix} a \\ b \\ c \end{matrix}$  )  $\begin{matrix} a \\ b \\ c \end{matrix}$   $\xrightarrow{\text{имп. енк. иск.}}$  A B C

F: A<sub>a</sub>B<sub>b</sub>C<sub>c</sub>; A<sub>a</sub>B<sub>b</sub>C<sub>c</sub>

имп. енк. иск.) имп. енк. иск.

имп. енк. иск.

| неимп:

a B C abc

Ответ: \_\_\_\_\_

ШИФР

11-99

## Практическое задание

### Лист ответа участника:

Рассмотрите рисунок гельминта на листе «Q». Определите тип, класс и видовое название гельминта, представленного на рисунке, и *запишите в таблицу*.

Используя информацию на листах А, Б, В, выполните задания:

- 1) Выберите под какими номерами на листе «А» указаны четыре характерные особенности строения и цикла развития, подходящие для данного паразита. *Цифры запишите в таблицу*;
- 2) Выберите под какими номерами на листе «Б» указаны четыре личиночные стадии, присутствующие в цикле развития данного паразита. *Цифры запишите в таблицу*;
- 3) На листе «В» изображены хозяева различных паразитов. Выберите четырех представителей, являющихся хозяевами данного гельминта. *Цифры запишите в таблицу*.

Лист Q	Лист А				Лист Б, личинки				Лист В, хозяева			
Систематическое положение гельминта:  Тип: Плоские черви  Класс: Сосальщики  Вид: Печёночный сосальщик	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
	1	4	5	7	1	4	5	7	1	3	5	7
Балл												

Итоговый балл:

## Лист «Q»




## Лист А


Особенности строения	
A1 – Промежутки между органами заполнены паренхимой	A5 – Кишечник состоит из передней и средней кишки
A2 – Первичная полость тела	A6 – Кишечник состоит из передней, средней и задней кишки
A3 – Семенники располагаются в задней части тела	A7 – Является гермафродитом
A4 – Семенники располагаются в середине тела	A8 – Имеются метанефридии

## Лист Б


### Личиночные стадии




Б1 – Мирадиций




Б5 – Метацеркарий




Б2 – Спороциста




Б6 – Цистицерк




Б3 – Плероцеркоид



Б7 – Редия



Б4 – Цистециркоид



Б8 – Онкосфера

## Лист В

### Хозяева



В1 – Крупный рогатый скот



В5 – Свиньи и кабаны



В2 – Рыбы семейства карповые



В6 – Моллюск – битиния



В3 – Кошки



В7 – Человек



В4 - Грызуны



В8 – Раки и крабы